

### Cumul des températures au 26 mars 2023 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	401°	Demi-montagne (500 à 850 m)	325°	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	223°	Montagne (> 1100 m)	184°
<b>Rappel 2022 : 407°</b>		<b>Rappel 2022 : 331°</b>		<b>Rappel 2022 : 214°</b>		<b>Rappel 2022 : 169°</b>	
CLERMONT 330 m	423°	SAYAT 550 m	364°	CHALMAZEL (42) 990 m	226°	ANZAT LUGUET 1270 m	185°
MOISSAT 340 m (*)	410°	AMBERT 555 m	316°	VERNINES 1045 m	241°	MONT DORE 1220 m	184°
ISSOIRE 372 m	386°	ST GERVAIS 705 m	310°	ST GERMAIN L'H. 1070 m	215°		
COURPIERE 455 m	393°	ST SULPICE 851 m	285°	MARCENAT (15) 1075 m	210°	(*) source technicien	
<b>Gain depuis 19 mars : +80°</b>		<b>Gain depuis 19 mars : +64°</b>		<b>Gain depuis 19 mars : +50°</b>		<b>Gain depuis 19 mars : +42°</b>	

### Sommes de température

**200 °C = apport d'azote** sur fauches précoces les 15 jours précédant.

**Entre 250 et 300°C = début des mises à l'herbe précoces**

**300°C = apport d'azote** sur fauche tardive

**300-350°C = semis et sursemis de prairies**

### Exploitations suivies en 2023

Lezoux (400 m – VL bio)	2 <sup>ème</sup> passage en cours avec affouragement
Ambert (550 m - VL)	Mise à l'herbe cette semaine
Augerolles (550 m - VA)	Mise à l'herbe de quelques VA avec affouragement
St Maurice près P. (600 m - VA)	Pas de mise à l'herbe prévue pour l'instant
Condat en Comb. (700 m - VA)	Apports d'azote terminés
Ceyssat (800 m- OL+VA)	Début des agnelages Pâturage d'un lot de VA avec affouragement
Laqueuille (1100 m - VA bio)	34 VA Salers, JB 15 mois finis herbe, Salers x Angus, 100% herbe
Picherande (1130 m - VL)	Reprise des épandages dès que possible

### Conseils de la semaine : Pâturage en plaine et demi-montagne et préparation des mises à l'herbe sur les plateaux selon la météo

**En plaine**, la croissance autour de 20 kgMS/ha/j est un peu en dessous de la moyenne habituelle. Si le stock d'herbe sur pied dans les pâtures ne permet pas de nourrir le troupeau, il est encore possible de faire déprimer des parcelles de fauche avant le repère des 500°. D'ici 10 à 15 jours, le 1<sup>er</sup> tour de pâturage devrait être terminé pour s'assurer d'avoir une herbe de qualité tout au long de la saison et maîtriser l'explosion de l'herbe.

**En demi-montagne bien exposée**, tous les troupeaux devraient commencer à pâturer pour assurer une transition alimentaire correcte, difficile à mener avec des hauteurs d'herbe importantes.

**En demi-montagne, sur parcelles plus froides**, les hauteurs restent modestes (moins de 5 cm). Ne pas entrer les animaux sur des parcelles avec une hauteur inférieure à 6 cm.

**Sur les plateaux d'altitude**, préparer la mise à l'herbe pour une sortie des animaux dès que les conditions météos seront de nouveau favorables.

**En montagne**, les apports d'azote et le hersage pourront reprendre dès que les conditions météos le permettront, notamment la portance des sols.

**Faire le tour des parcelles pour envisager l'ordre de pâturage. Ne pas hésiter à faire tourner les animaux très rapidement pour ménager les parcelles !**