

Cumul des températures au 23 avril 2023 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

| Plaine (300 à 500 m) | 678 ° | Demi-montagne (500 à 850 m) | 548 ° | Plateaux d'altitude (850 à 1100m) | 381 ° | Montagne (> 1100 m) | 315 ° |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Rappel 2022 : 697 ° | | Rappel 2022 : 576 ° | | Rappel 2022 : 399 ° | | Rappel 2022 : 339 ° | |
| CLERMONT 330 m | 712 ° | SAYAT 550 m | 622 ° | CHALMAZEL (42) 990 m | 388 ° | MONT DORE 1220 m | 316 ° |
| MOISSAT 340 m (*) | 687 ° | AMBERT 555 m | 541 ° | VERNINES 1045 m | 405 ° | ANZAT LUGUET 1270 m | 314 ° |
| ISSOIRE 372 m | 664 ° | ST GERVAIS 705 m | 524 ° | ST GERMAIN L'H. 1070 m | 364 ° | | |
| COURPIERE 455 m | 657 ° | ST SULPICE 851 m | 477 ° | MARZENAT (15) 1075 m | 369 ° | (*) source technicien | |
| Gain depuis 16 avril : + 79° | | Gain depuis 16 avril : + 66° | | Gain depuis 16 avril : + 51° | | Gain depuis 16 avril : + 45° | |

Sommes de température

Entre 250 et 300°C : début des mises à l'herbe précoces
 300°C : apport d'azote sur fauche tardive
 500 °C : arrêt du déprimage
 650 – 700 °C : début des fauches précoces (ensilage, foin ventilé...)

Exploitations suivies en 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Lezoux (400 m – VL bio) | 3 ^{ème} tour. Pâturage jour et nuit avec un peu d'affouragement |
| Ambert (550 m - VL) | 2 ^{ème} tour en cours. Pâturage jour et nuit |
| Augerolles (550 m - VA) | Milieu du 2 nd tour |
| St Maurice près P. (600 m - VA) | Fin des mises à l'herbe |
| Condat en Comb. (700 m - VA) | Tous les lots sont sortis |
| Ceyssat (800 m- OL+VA) | Milieu du 1 ^{er} tour |
| Laqueuille (1100 m - VA bio) | Début des mesures |
| Picherande (1130 m - VL) | Pas de mise à l'herbe prévue en raison du manque d'herbe |

Conseils de la semaine : ensilages des prairies temporaires en plaine, fin du 1^{er} tour de pâturage en demi-montagne et début du pâturage sur les plateaux

En plaine, les ensilages de ray grass débutent cette semaine avec des rendements qui semblent corrects. A 3 - 400 m d'altitude, pour les autres prairies ayant reçu de la fertilisation, le compromis quantité/qualité (début épiaison) devrait être atteint en fin de semaine. Pour les autres, il semblerait qu'il faille encore attendre un peu.

En demi-montagne, même si la pousse reste en dessous de la normale, il est impératif de faire le tour des parcelles. Certaines ont bien évolué et offrent une quantité d'herbe non négligeable dont il faut profiter. Tous les troupeaux devraient être sortis ! Jusqu'à 700 m, le stade repère de fin du 1^{er} tour (500°) est atteint : passé ce délai, on maîtrise peu ou pas la pousse et la qualité de l'herbe proposée. Plus en altitude, il reste environ une semaine pour terminer ce 1^{er} tour ou faire du déprimage.

Sur les plateaux d'altitude, les prairies ont peu évolué en raison des conditions froides, ce qui implique des adaptations : soit plus de surface à mettre à disposition soit une complémentation en fourrage conséquente pour les troupeaux qui sont sortis. Même si le 1^{er} tour est rapide, les animaux consomment les pointes gelées, ce qui favorise la repousse mais il faut veiller à ne pas descendre trop ras.

En montagne, les hauteurs d'herbe sont encore trop limitées pour débuter des mises à l'herbe. Si un étaupinage est nécessaire, seul un outil non agressif peut être encore envisagé sur les prairies tardives. A ce stade, toute intervention agresse le couvert végétal et freine encore son démarrage.